

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

ÉDITION DE LA STATION "LANGUEDOC-ROUSSILLON"

(AUDE GARD HERAULT LOZERE PYRENEES ORIENTALES)

SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

MAISON DE L'AGRICULTURE BAT 5 PLACE CHAPTAL

34076 MONTPELLIER CEDEX TEL 92.41 42

ABONNEMENT ANNUEL

Régisseur de recettes de la D.D.A

C.C.P. Montpellier 5238-57

26 mai 1982

Destiné aux agriculteurs du LAURAGAIS

AVERTISSEMENT N° 7

(rédigé en collaboration avec la ferme de LOUDES, les
GVA, les CIVAM de l'Aude et l'I.T.C.F.)

TRAITEZ

Malgré la sécheresse LA ROUILLE BRUNE a explosé dans la plupart des situations où elle était présente.

Les blés atteignent souvent le stade limite pour être protégés (pleine floraison).

Si vos cultures ont encore un bel aspect malgré la sécheresse persistante traitez -les d'urgence si la rouille brune se trouve sur les deux dernières feuilles du haut, avec :

. VIGIL K à raison de 1,25 litre de produit commercial par hectare,
ou

. TILT C à raison de 1 litre de produit commercial.

L'application se fera de préférence le matin ou le soir à raison de cinq cents litre de bouillie à l'hectare.

En 1981 dans un essai sur *Mondur*, un traitement tardif de la rouille brune (*stade grains laitoux - pateux*) a permis un gain de 7,5 quintaux par hectare par rapport au témoin.

. LES PUCERONS présents dans de nombreux champs doivent être traités jusqu'à la "pleine floraison" du blé, si un épi sur deux porte au moins cinq pucerons.

Utilisez PIRIMOR G à raison de 0,250 kilo / hectare de produit commercial, et mélangez en cas de nécessité avec l'un des deux fongicides conseillés pour la rouille brune.

. SURVEILLEZ vos champs déjà traités, il se peut que la progression de la rouille brune rende nécessaire un deuxième traitement. Voir paragraphe ci-dessus.

Tirage du 26 mai 1982 - 1 100 exemplaires

© - Bulletin technique des avertissements agricoles - MONTPELLIER 1982

31